

GENERALIDADES

Producto:	VIAMOCARB 450 SC
Tipo de producto:	Fungicida de uso agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada - SC
Categoría Toxicológica:	4- Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Papa y tomate
Presentación Disponible:	1 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VIAMOCARB 450 SC es un fungicida con acción protectante y curativa, que combina la acción de dos ingredientes activos.

Cymoxanil: Posee acción protectante y curativa, su modo de acción es sistémico local (translaminar) y de contacto; inhibe la esporulación.

Propamocarb: Es un fungicida sistémico con acción protectante, el cual se absorbe por las raíces y la hojas de las plantas tratadas.

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:

Cymoxanil. 50 g/L

1-[(E)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea de formulación a 20°C

Propamocarb. 400 g/L

propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos. c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	L.M.R.*	P.R.
PAPA	Gota <i>(Phytophthora infestans)</i>	1.0 L/ha	1 día	CIMOXANIL 0.01 mg/kg	4 horas
				PROPAMOCARB 0.3 mg/kg	
TOMATE	Gota <i>(Phytophthora infestans)</i>	1.0 L/ha	1 día	CYMOXANIL 0.4 mg/kg	
				PROPAMOCARB 2.0 mg/kg	

P.C.: Período de carencia: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

FICHA TÉCNICA
VIAMOCARB 450 SC
Registro Nacional No. PL0009622023
Titular del Registro: AGROACTIVA JVR S.A.S.



P.R.: Período de Reentrada: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

VIAMOCARB 450 SC es un fungicida sistémico que debe aplicarse cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, dentro de un Programa de Manejo Integrado de enfermedades.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica, luego complete con agua hasta el volumen final. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas. Se recomienda utilizar equipos convencionales con boquillas TX-1, TX-2, o sus equivalentes. Use el volumen de agua requerido para un adecuado cubrimiento, según el desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOXOCIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fueras de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:

AGROACTIVA JVR S.A.S.